

Informatiefolder

Na de narcosebehandeling

Je hebt een behandeling onder algehele narcose ondergaan bij VieDenta Kliniek. Mogelijk kunnen er nog enige bijwerkingen optreden na de behandeling. In deze folder willen wij jou informeren over deze mogelijke bijwerkingen en wat je eventueel kunt doen om ze te verhelpen.

Het infuus

Na de behandeling wordt het infuus, dat bij je is aangebracht, verwijderd. Op de plaats waar het infuus zat, wordt een pleister aangebracht. Het is mogelijk dat er een blauwe plek ontstaat op de plaats waar het infuus heeft gezeten. Dit kan geen kwaad en trekt vanzelf weer weg in de loop van 1 of 2 weken. Het kan ook gebeuren dat de plaats waar het infuus heeft gezeten door bewegen of stoten weer gaat bloeden. Wanneer dit gebeurt, hoef je daar niet van te schrikken. Het beste kun je een schoon servetje dubbelvouwen en minimaal 5 minuten afdrukken, waardoor het bloeden gestopt zal worden. Zo nodig kun je dit herhalen. Je kunt erna nog een pleister plakken, maar dit is niet persé noodzakelijk.

Pijn in de neus/keel

Je hebt tijdens de narcose een beademingsbuisje, via de neus, in de keel aangebracht gekregen. Doordat er lichaamsvreemd materiaal door je neus en keel is gegaan, kan dat enige irritatie geven op de slijmvliezen van de neus en de keel. Daarnaast kun je ook last hebben van wat bloed uit de neus of een zwaar of kriebelig gevoel achter in de keel. Ook kan het zijn dat je moet hoesten door de irritatie. Als dit optreedt, kan dat geen kwaad. De irritatie trekt na enkele dagen vanzelf weer weg.

Slaperigheid

Je bent behandeld onder algehele narcose met zeer kortwerkende middelen. Desondanks kun je na de behandeling een slaperig, duf en vermoeid gevoel hebben. Dit kan verder geen kwaad. Je dient de dag van de behandeling en de dag erna lekker rustig aan te doen. De eerste 24 uur na de behandeling dient er sowieso een volwassene bij je in de buurt te zijn, die je kan helpen en zo nodig voor je kan zorgen. Je mag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer gedurende de eerste 24 uur na de behandeling.

Eten en drinken

Je kunt voorzichtig weer beginnen met drinken als je thuis bent. Drink niet meteen grote hoeveelheden. Wees ook nog voorzichtig met eten. Pas wanneer het goed gaat met drinken, kun je voorzichtig wat proberen te eten. Probeer de dag van de behandeling alleen licht verteerbaar voedsel te eten. Als alles goed gaat, kun je de volgende dag weer eten en drinken volgens je normale patroon.

Misselijkheid en braken

Met de middelen die wij gebruiken voor de narcose, is de kans op het ontstaan van misselijkheid en braken na de narcose zeer klein. Desondanks bestaat er een kleine kans dat er na de behandeling toch misselijkheid en braken bij je optreedt. Mocht dit toch gebeuren? Wees dan voorzichtig met het nuttigen van eten en drinken tot het gevoel van misselijkheid weg is. Mocht je door de misselijkheid 1 of 2 keer moeten braken, dan is dat (hoe vervelend het ook is) niet schadelijk. Mocht de misselijkheid na 1 of 2 keer braken blijven aanhouden, dan kun je de medicijnen tegen de misselijkheid die je op recept hebt meegekregen innemen. Mocht het na het innemen van de medicijnen niet lukken om de misselijkheid en het braken te onderdrukken, dan kun je contact opnemen met de kliniek voor nader advies.

Pijn

De tandarts heeft een behandeling bij je uitgevoerd, die gepaard kan gaan met napijn. De verdoving die de tandarts heeft ingespoten tijdens de behandeling, zal in de uren na de behandeling langzaam uitwerken. Afhankelijk van de behandeling zijn enige klachten zoals pijn of zwellingen mogelijk. Mochten er na de behandeling onder narcose andere complicaties optreden of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

VieDenta Kliniek
(Apollonia B.V.)
Jeroen Boschstraat 10
5854 CZ NIEUW-BERGEN
info@viedenta.nl / 085-0133500