

Informatiefolder

Voorafgaand aan narcosebehandeling

Je ondergaat binnenkort een behandeling onder narcose bij VieDenta Kliniek. In deze informatiefolder vind je nuttige en belangrijke informatie over de dagbehandeling. Wij verzoeken je vriendelijk deze informatiefolder goed door te lezen en de aanwijzingen m.b.t. voorbereidingen op te volgen.

Planning van de behandeling

Je krijgt de exacte datum en tijdstip van de behandeling nog van ons doorgegeven. Je wordt geïnformeerd over het tijdstip dat je aanwezig dient te zijn en de tijdsduur die naar verwachting nodig is voor jouw behandeling.

Voorbereidingen thuis

- Heb je een behandeling **voor** 12:00 uur, dan mag je **niet** meer eten na 00:00 uur de avond van tevoren.
- Heb je een behandeling **na** 12:00 uur, dan mag je om 06:00 uur in de ochtend nog 1 beschuitje eten.
- Tot 2 uur voor de operatie mag je alleen water of thee (zonder melk) drinken. Overige dranken zoals koffie, melk of frisdranken mogen niet worden genuttigd.
- Je dient minimaal 6 uur voor de behandeling te stoppen met roken.
- Indien je reeds een gebitsprothese hebt, dan dien je deze uit te doen voordat de behandeling onder narcose wordt gestart.
- Minimaal 1 vinger dient vrij te zijn van eventuele kunst- of gelnagels of nagellak.
- Alle sieraden en piercings in de mond of neus kun je het beste thuis al af doen.
- Je dient op de dag van de behandeling 's ochtends thuis alvast 2 paracetamol te slikken. Op deze manier bouw je alvast een peil op die de eerste pijn na de behandeling tegen zal gaan. De paracetamol mag gewoon met water worden ingenomen.

Het niet opvolgen van deze adviezen kan vergaande nadelige gevolgen hebben voor jouw gezondheid tijdens de behandeling onder narcose. Het is geheel in jouw belang dat je je strikt aan deze voorschriften houdt. De behandeling onder narcose zal, om jou geen onnodige risico's te laten lopen voor je gezondheid, niet worden uitgevoerd als blijkt dat de voorschriften niet zijn nageleefd.

De narcosebehandeling

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de stappen die gevolgd worden voor de behandeling onder narcose:

De (pre-operatieve) screening

Voordat je onder narcose behandeld kunt worden, dien je een uitgebreide medische vragenlijst in te vullen, zodat de anesthesioloog jouw gezondheidstoestand kan inschatten om zo de eventuele risico's voor jou zo laag mogelijk te houden. Zo nodig kunnen er ook aanvullende onderzoeken aangevraagd worden (denk aan een hartfilmpje of bloed laten prikken) of kan er aanvullende informatie opgevraagd worden bij jouw huisarts of behandelend specialist. Pas nadat alle benodigde gegevens ontvangen en beoordeeld zijn door de anesthesioloog, kan er goedkeuring gegeven worden voor de behandeling onder narcose. Als de risico's voor jouw gezondheid te hoog blijken, dan kan het zijn dat de anesthesioloog de behandeling onder narcose afkeurt. Je dient er rekening mee te houden dat dit ook bij jou kan gebeuren.

Monitoring

Vlak voordat je onder narcose gaat, word je aangesloten op een monitor. Je krijgt stickers op de borst geplakt voor de controle van het hartritme, een bloeddrukbandje om de arm die de bloeddruk meet en een metertje op je vinger om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Pas na het aansluiten hiervan zal de anesthesie starten.

Inbrengen infuus

Omdat wij zogenaamde Totaal Intraveneuze Anesthesie (TIVA) toepassen, dient er eerst een infuus ingebracht te worden. Dit betekent dat je een prik in de hand of onderarm krijgt en dat de anesthesiemiddelen rechtstreeks in de bloedbaan worden toegediend. Wanneer je ontzettend tegen deze prik opziet of hier angstig voor bent, dan kun je dit voorafgaand aan de behandelingsdag doorgeven. Je ontvangt dan van ons een recept om een speciale pleister op te halen bij de apotheek. Deze pleister verdooft de huid voordat het infuus wordt geplaatst. Wanneer je de pleister meeneemt op de dag van behandeling, zal de anesthesioloog deze bij binnenkomst op de juiste plek aanbrengen.



Narcosemiddelen

De middelen die wij toepassen voor de narcose zijn de uiterst moderne, zeer kortwerkende middelen propofol en remifentanyl. Deze middelen werken zo kort dat je na het stoppen van de toediening snel weer wakker bent en weinig kans hebt op het ervaren van vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken.

De narcose

Nadat alle monitoring is aangesloten, zullen via het infuus langzaam de narcosemiddelen worden toegediend. Dit kan een wat prikkend of brandend gevoel in de hand of in de arm geven. Dit kan geen kwaad en trekt vanzelf weer snel weg. Vlak voordat je wegdoezelt krijg je nog een kapje voor de zuurstof, waarna je snel in slaap valt. Zodra de behandeling klaar is, word je weer wakker gemaakt. Aangezien wij niet met spierverslappers werken, is het volledig uitgesloten dat je tijdens de behandeling wakker wordt, maar niet kunt bewegen (zoals in sommige films wel eens gebeurt). Je hoeft je hierover dan ook geen zorgen te maken.

Bijkomen na de narcose

Nadat de behandeling klaar is, word je wakker in de tandartsstoel. Zodra je wakker bent, word je in een speciale comfortabele rolstoel overgebracht naar een kamer waar je rustig even bij kunt komen. Jouw begeleider mag bij je zijn totdat je voldoende bij bent gekomen om naar huis te gaan. De anesthesioloog controleert regelmatig of je daar klaar voor bent.

Mogelijke risico's van de narcose

De anesthesie is tegenwoordig één van de veiligste specialismes binnen de geneeskunde met de laagste risico's. Toch zijn er een aantal risico's die we hier kort zullen opsommen:

- Tijdens de narcose wordt er m.b.v. instrumenten een buisje via de keel in de luchtpijp ingebracht. Tijdens het inbrengen zou er een beschadiging op kunnen treden aan een of meerdere tanden.
- Wanneer je onder narcose bent, verdwijnen sommige beschermende reflexen, waardoor zure maaginhoud omhoog zou kunnen komen en in de longen kan lopen. Hierdoor kan er een ernstige longontsteking ontstaan. Vandaar ook dat het zeer belangrijk is dat je je absoluut aan de voorschriften houdt m.b.t. het nuchter zijn (geen eten en drinken) voorafgaand aan de behandeling. Je verkleint hiermee de kans op complicaties aanzienlijk.
- Er kunnen bloeddrukschommelingen ontstaan door anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen opvangen.
- Er kan een allergische reactie ontstaan na het inspuiten van de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen opvangen.
- Er kunnen hartritmestoornissen ontstaan door de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit echter met medicijnen en apparatuur opvangen.
- Er kan, als je daarvoor gevoelig bent, een astma-aanval ontstaan door het inbrengen van het buisje in de luchtpijp. Wij kunnen dit met medicijnen opvangen. Wel is het belangrijk dat je eventuele medicijnen die je gebruikt voor de longen (zoals pufjes) de dagen en ochtend voor de behandeling altijd goed inneemt en de medicijnen ook altijd meeneemt op de dag van de behandeling.
- Je kunt na de narcose enige misselijkheid ervaren of zelfs braken. Wij kunnen dit met medicijnen over het algemeen goed opvangen.

Na de behandeling

Zodra je voldoende bij bent gekomen en de anesthesioloog goedkeuring heeft gegeven, mag je weer naar huis. Het is voor jouw eigen veiligheid van groot belang dat je de volgende regels in acht neemt, voordat je naar huis mag:

- Je mag de eerste 24 uur niet deelnemen aan het verkeer. Je mag dus niet zelf naar huis rijden.
- Je mag niet alleen naar huis. Je dient een begeleider mee te nemen op de dag van de behandeling.
- De eerste 24 uur na de behandeling mag je niet alleen zijn.

VieDenta Kliniek (Apollonia B.V.)

Jeroen Boschstraat 10
5854 CZ NIEUW-BERGEN
info@viedenta.nl / 085-0133500



VieDenta Kliniek



VieDenta Kliniek